

KLINIČNA POT: AGOMELATIN	UVAJANJE/SPREMEMBA ODMERKA, ODMERNEGA INTERVALA ALI FO						VZDRŽEVALNO SPREMLJANJE			
	Pred uvedbo	Po 3 tednih	Po 6 tednih	Po 3 mesečih	Po 6 mesečih	Po 9 mesečih	V kolikor je klinično indicirano ¹	Vsakih 6 mesecev		Enkrat letno
Hemogram in DKS	<input type="checkbox"/>									
Hepatogram ²	<input type="checkbox"/> ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Glukoza	<input type="checkbox"/>									
Lipidogram	<input type="checkbox"/>									
TSH, T3, T4	<input type="checkbox"/>									
Kreatinin, oGF	<input type="checkbox"/>									
Sečnina	<input type="checkbox"/>									
Urin	<input type="checkbox"/>									
Telesna teža	___ kg								___ kg	___ kg
Telesna višina	___ m								___ m	___ m
ITM	___ kg/m ²								___ kg/m ²	___ kg/m ²
Krvni tlak, pulz	___ mmHg ___ /min								___ mmHg ___ /min	___ mmHg ___ /min
Podpis zdravnika:							Podpis vpiši pod okvirček (ob strani pusti prostor še za DMS)			
Datum:							Datum in podpis vpiši ob okvirčku.			
Podpis:										

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Zaporedna št. obrazca: _____

¹ Ob spremembah, ki bi lahko bile posledica toksičnega delovanja agomelatina ali vplivale na njegovo koncentracijo (patološke vrednosti testov jetrne funkcije, sprememba ostale terapije (ukinitev ali uvedba encimskega induktorja), sum na slabo adherenco)

² zgornja meja ref. int. < AST in/ali ALT < 3x zgornja meja ref. int. → ponovi teste v obdobju 48 h

AST in/ali ALT > 3x zgornja meja ref. int. → **takojšnja ukinitev** agomelatina, ponavljanje lab. testov do normalizacije

Referenčne vrednosti: S-ALT < 0,56 μ kat/L

S-AST < 0,58 μ kat/L

S-gama GT < 0,92 μ kat/L

³ Zdravljenja z agomelatinom se ne sme uvesti v primeru, da so vrednosti jetrnih testov nad tri-kratnikom zgornje meje referenčnega območja. V primeru vrednosti, večjih od zgornje meje referenčnega območja, a manjših od tri-kratnika zgornje meje referenčnega območja, se svetuje previdnost pri uvajanju in ocena prisotnosti dejavnikov tveganja.